

## ORIENTAÇÕES

### CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDICA REPOUSO (40701069) E

### ESTRESSE (ESFORÇO 40701140 / FARMACOLÓGICO 40701131)

<b>INDICAÇÕES</b>	Este exame é utilizado para avaliar a presença de músculo cardíaco íntegro e a sua função regional, em situação de repouso e após estresse. Pode-se pesquisar as mais variadas doenças, tendo como a principal a doença coronariana obstrutiva.												
<b>PREPARO</b>	<p>Não precisa de jejum. Evitar exercícios nas últimas 24 horas do exame. Evitar a ingestão de café, chá mate ou chocolate de 12 a 24 horas. Dieta leve no dia do exame.</p> <p>Comparecer com roupas leves e confortáveis para a realização do teste de estresse (evitar cremes).</p> <p>Alguns remédios são interrompidos sob a supervisão de seu médico para melhor uso da cintilografia (diagnóstico / prognóstico).</p> <p>Para a realização da esteira, interromper:</p> <table><tr><td>Propranolol, Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol, Nadolol</td><td>3 a 5 dias</td></tr><tr><td>Cardizen, Diltiazem, Verapamil</td><td>2 dias</td></tr><tr><td>Sustrate, Isordil, Isossorbida</td><td>1 dia</td></tr></table> <p>Para a realização do estresse com Dipiridamol:</p> <table><tr><td>Propranolol, Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol, Nadolol</td><td>1 dia</td></tr><tr><td>Cardizen, Diltiazem, Verapamil</td><td>1 dia</td></tr><tr><td>Sustrate, Isordil, Isossorbida</td><td>1 dia</td></tr></table>	Propranolol, Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol, Nadolol	3 a 5 dias	Cardizen, Diltiazem, Verapamil	2 dias	Sustrate, Isordil, Isossorbida	1 dia	Propranolol, Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol, Nadolol	1 dia	Cardizen, Diltiazem, Verapamil	1 dia	Sustrate, Isordil, Isossorbida	1 dia
Propranolol, Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol, Nadolol	3 a 5 dias												
Cardizen, Diltiazem, Verapamil	2 dias												
Sustrate, Isordil, Isossorbida	1 dia												
Propranolol, Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol, Nadolol	1 dia												
Cardizen, Diltiazem, Verapamil	1 dia												
Sustrate, Isordil, Isossorbida	1 dia												
<b>EXAME</b>	Imagens do coração são realizadas em duas fases após 30 a 90 minutos da administração venosa do medicamento, com o paciente em posição deitado por 20 minutos por fase. As duas fases podem ser realizadas no mesmo dia ou em dias separados, com duração em média de 4 horas no total.												
<b>RISCOS</b>	Não é administrado medicamento com iodo. A medicação contém mínima quantidade de radiação, apenas para a realização das imagens.												
<b>EXAMES ANTERIORES</b>	São importantes para a correlação com a cintilografia, como o ECO, ECG, Teste Ergométrico ou Cateterismo.												